

Recomendaciones de uso:

Coloque Taxat® Cebo Fresco al encontrar signos de presencia de roedores.

Utilizar guantes al manejar los cebos.

USO

Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas y otros.

LUGAR

Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, entretechos, alcantarillas, orillas de canales y tránsito de roedores.

DOSIS

Según el nivel de infestación

Para ratones colocar 1 sachet cada 2 a 4 metros lineales.

Para ratas colocar 1 a 2 sachet cada 5 a 10 metros lineales.

CONSIDERACIONES:

Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los sachet consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo.

De preferencia disponer los sachet dentro de cajas o tubos cebaderos, sin necesidad de removerlos de la bolsa, para evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto.

PRECAUCIONES GENERALES:

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Mantener alejado de niños y personas no responsables.
- No desechar en cursos de agua, lagos o ríos.
- Tóxico para organismos acuáticos, tóxico para animales domésticos y aves.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



CEBO FRESCO GRANULADO 0,005%

PLAGAS QUE CONTROLA: TAXAT® CEBO FRESCO, FORMULADO A BASE DE BRODIFACUM, MATA TODO TIPO DE RATAS Y RATONES URBANOS Y SILVESTRES



RATICIDA DE SEGUNDA GENERACIÓN DE ACCIÓN ANTICOAGULANTE QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE RATAS, RATONES Y LAUCHAS URBANOS Y SILVESTRES

- Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- Taxat® Cebo Fresco controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- Los roedores mueren a los pocos días después de la ingesta, lejos del lugar de ingestión.
- Su presentación en forma de granos molidos de maíz y trigo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.



CONTENIDO NETO

10Kg.

CONDICIÓN DE VENTA: VENTA GENERAL

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de producto contiene:

Brodifacum (*) 0,005 g.
N° CAS: 56073-10-0
Benzoato de denatonio 0,2 g.
Mezcla de cereales y colorante. c.s.p., 100 g.

(*) 3-[3-(4'-bromofenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarina

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO
NO CORROSIVO**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica, irritante dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. **En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** lavar con abundante agua.

ANTÍDOTO: Vitamina K₁ bajo supervisión médica.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:

Brodifacum: Grupo químico: Hidroxicumarina.
Este Producto es clase IV OMS/EPA: "Poco probable peligro en su uso normal"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)

Point Chile: (2) 2747 1677

DESTRUYA LOS ENVASES UNA VEZ VACÍO, SIN CONTAMINAR, LÁVELO PREVIAMENTE, EN CASO QUE CORRESPONDA, ANTES DE DESECHAR. NO REUTILIZAR LOS ENVASES.

FABRICADO POR:

Point Agro-China Ltd., China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950 OF. 10,
Quilicura, Santiago, Chile.

MODO DE ACCIÓN: Anticoagulante

REGISTRO ISP: P-768/21

Fecha de vencimiento: 24 meses después de la fecha de elaboración.

Contenido Neto:

Número de Lote: