

RATICIDA DE SEGUNDA GENERACIÓN DE ACCIÓN ANTICOAGULANTE, FORMULADO A BASE DE BRODIFACUM, QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE RATAS, RATONES Y LAUCHAS URBANOS Y SILVESTRES.

- Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- √ Taxat® controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- Los roedores mueren a los pocos días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
- Su presentación en granos molidos de maíz y trigo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.



Brodifacum

NOMBRE QUÍMICO:

(*) 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4tetrahidro-1-naftil]- 4- hidroxicumarina

GRUPO QUÍMICO:

Hidroxicumarina

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:

0,005% (Cebo fresco granulado) 0,005% (Mini bloque)

MODO DE ACCIÓN:

Anticoagulante

PRESENTACIÓN:

Cebo fresco granulado: Balde 10 Kilos Mini bloque: Balde 5 kilos

FABRICANTE/FORMULADOR:

Point Agro-China Ltd.

DISTRIBUIDOR EN CHILE:

Point Chile S.A.

ANTÍDOTO:

Vitamina K1

TOXICIDAD:

Clase IV OMS/EPA: Poco probable peligro en su uso normal

REGISTRO ISP:

Cebo fresco granulado P-779/16 Mini Bloque P-768/16

RECOMENDACIONES DE USO

Coloque Taxat® Cebo Fresco al encontrar signos de presencia de roedores. Utilizar guantes al manejar los cebos.

LUGAR

Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas y otros. Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, entretechos, alcantarillas, orillas de canales y

tránsito de roedores.

DOSIS

Según el nivel de infestación:

Para ratones colocar 1 sachet o mini bloque cada 2 a 4 metros lineales.

Para ratas colocar 1 a 2 sachet o mini bloques cada 5 a 10 metros lineales.

CONSIDERACIONES

Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los sachet consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo. De preferencia disponer los sachet dentro de cajas o tubos cebaderos, sin necesidad de removerlos de la bolsa, para evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto.



- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- · Almacenar a temperatura ambiente.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Mantener alejado de niños y personas no responsables.
- No desechar en cursos de agua, lagos o ríos.
- Tóxico para organismos acuáticos, tóxico para animales domésticos y aves.



