

## PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol, guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su etiqueta correspondiente, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso. **Cuando se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos.**

**FOLIAR-K** al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada. Cuando se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos.

## COMPATIBILIDAD

**FOLIAR-K** es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM**. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **FOLIAR-K**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

## NOTA AL COMPRADOR

**Descargo de responsabilidades:** Los factores que influyen en la aplicación del producto son variables. Entre ellos la calidad del agua, la calibración de los equipos, la dosis efectivamente aplicada, las mezclas con otros productos, el almacenamiento, las condiciones meteorológicas y la fertilización realizada. Por lo anteriormente indicado, no podemos garantizar el efecto y la selectividad del producto bajo todas las circunstancias y, por lo tanto, no seremos responsables de las pérdidas directas, indirectas o accidentales que se deriven de ello. En caso de duda, los usuarios deberán realizar las pruebas pertinentes o consultar a nuestro personal técnico antes de utilizar el producto.

# FOLIARK

## CONCENTRADO SOLUBLE (SL) CORRECTOR DE DEFICIENCIA

Alta concentración del catión potasio fácilmente asimilable, tanto por vía foliar como radicular, mediante cualquier sistema de riego.

**FOLIAR-K** suministra potasio asimilable en concentraciones adecuadas para prevenir carencias y facilitar la recuperación.

El potasio es fundamental para inducir la coloración de frutos y favorecer la síntesis y acumulación de azúcares en los órganos de reserva. El fósforo mejora la asimilación y disponibilidad del catión.

Composición	%p/v
Potasio (K <sub>2</sub> O)	32,6
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	1,1

Metales Pesados	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<0,5	<5,0

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH(sol.0,1%): 8,6  
Densidad: 1,5 g/mL  
Solubilidad: 99,7%

### Fabricado y Distribuido por: POINT CHILE S.A.

Evaristo Lillo 48, of. 1401, Las Condes,  
Santiago, Chile - Fono: +56 2238 49840  
E-mail: chile@pointamericas.com

[www.point.cl](http://www.point.cl)



Contenido Neto: 1 Litro

## RECOMENDACIONES DE USO

Especie Frutal	Dosis* L/ha	Aplicaciones
Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro	2 a 3	Aplicar 3 a 4 veces, desde caída de pétalos.
Cerezo, Ciruelo, Guindo	2,5 a 3	Desde fruto cuajado, cada 10 días.
Vid de mesa y vinífera	2 a 3	3 a 4 aplicaciones desde inicio de brotación. En variedades de color, desde cierre de racimo.
Manzanos, Perales	3 a 3,5	3 a 4 aplicaciones cada 15 días desde caída de pétalos.
Cítricos, Paltos	3,5 a 4	Aplicaciones desde fruto cuajado, repetir cada 15-20 días.
Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla	1 a 2	Aplicaciones desde fruto cuajado, cada 10-15 días.

\*Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y periodicidad dependen del diagnóstico en terreno del profesional a cargo, respaldado por el análisis foliar.

Vía riego: 4 a 10 L / ha en cada aplicación. En fertirriego, la dosis también depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.

Cultivos y Hortalizas	Dosis cc/100 L	Aplicaciones
Acelga, Espinaca, Lechuga, Coliflor, Brócoli	2,5 a 3	2 a 3 aplicaciones desde un mes después del trasplante.
Melón, Sandía, Zapallo	1,5 a 2	3 a 4 aplicaciones desde fruto cuajado.
Tomate, Pimiento, Pepino	1 a 2,5	Aplicaciones desde fruto formado, repitiendo cada 10 - 15 días.
Papa	2 a 3	2 a 3 aplicaciones después de la aporca (planta de 25-30 cm.)
Remolacha	1,5 a 2	2 a 3 aplicaciones cada 15 días desde 6 hojas verdaderas.
Zanahoria	2 a 3	2 a 3 aplicaciones cada 15 días a partir de 3 hojas verdaderas.

Fecha de Fabricación:

Lote de Fabricación:

Fecha de Vencimiento: