

PRECAUCIONES

Durante la preparación: Para evitar respirar los vapores, usar máscara con filtro. Para evitar el contacto con la piel y los ojos, usar guantes impermeables, botas de goma y antiparras.

Durante la aplicación: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar. Luego de la aplicación, lavarse con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Usar guantes durante la aplicación y preparación. No comer ni beber durante las operaciones.

NO FUMAR DURANTE SU PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.

COMPATIBILIDAD

Agitar el envase de **RUKAM Kuaja**® debe aplicarse solo. No realizar mezclas con otros fertilizantes, abonos foliares o plaguicidas, a excepción de **RUKAM Imw** y **RUKALG**®

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **RUKAM Kuaja**® y llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

NOTA AL COMPRADOR

Los factores que influyen en la aplicación del producto son variables. Entre ellos la calidad del agua, la calibración de los equipos, la dosis efectivamente aplicada, las mezclas con otros productos, el almacenamiento, las condiciones meteorológicas y la fertilización realizada. Por lo anteriormente indicado, no podemos garantizar el efecto y la selectividad del producto bajo todas las circunstancias y, por lo tanto, no seremos responsables de las pérdidas directas, indirectas o accidentales que se deriven de ello. En caso de dudas. Los usuarios deberán realizar las pruebas pertinentes o consultar a nuestro personal técnico antes de utilizar el producto.

RUKAM® kuaja

Líquido en solución Concentrado Soluble (SL) FERTILIZANTE

RUKAM Kuaja® aporta molibdeno y boro, los que interactúan con los demás nutrientes de la planta, logrando un equilibrio adecuado que estimula la respuesta del vegetal frente a condiciones adversas.

El aporte de molibdeno de **RUKAM Kuaja**®, logra una rápida inmovilización de las fuentes de nitrógeno soluble transformándolo en nitrógeno de reserva no disponible para el cultivo, generando una inmediata detención del crecimiento vegetativo, por lo cual todos los fotosintetados producidos son usados en crecimiento reproductivo de flores y frutos. El Boro de la formulación estimula la germinación del polen y la elongación del tubo polínico, lo que aumenta la probabilidad de fecundar los óvulos receptivos, lo que permite una mayor producción del cultivo.

Composición	%p/v
Boro	2,25
Molibdeno	0,53

Metales Pesados	Cr	Cr VI	Cd	As	Pb	Hg	Ni	Cu	Zn
ppm	<0,53*	ND*	<0,53	<2,10	<2,10	<0,10	<0,53	2,24	3,59

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH: 7,43
Densidad: 1051g/L

*ND= No detectado

Fabricado y Distribuido por: **POINT CHILE S.A.**

Evaristo Lillo 48, of. 1401, Las Condes,
Santiago, Chile - Fono: +56 2238 49840
E-mail: chile@pointamericas.com

www.point.cl



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

RECOMENDACIONES DE USO

RUKAM Kuaja® puede aplicarse en tomate, cualquiera sea el método de cultivo y la época del año, pero está especialmente recomendado para cultivos de tomate en otoño y de primor bajo plástico. Ayuda a expresar el potencial varietal sin dañar la planta o deformar los frutos (a diferencia de los fitoreguladores, que eventualmente pueden producir efectos fitotóxicos). La misma efectividad se puede obtener en cucurbitáceas. En semilleros de brócoli, bunching y lechuga permite aumentar los rendimientos.

Cultivos	Dosis* L/ha	Aplicaciones
Tomate de crecimiento Determinado	2 a 3*	Aplicar a toda la planta procurando un mojamiento adecuado. Repetir el tratamiento cada 7-10 días, de acuerdo al ritmo de apertura de las flores.
Tomate de Crecimiento Indeterminado	3 a 4*	Aplicar en forma dirigida a los racimos florales cuando tengan 3 o más flores abiertas. Repetir el tratamiento cuando haya nuevas flores abiertas no tratadas. No realizar más de dos aplicaciones sobre el mismo racimo.
Indeterminado de larga vida	4 a 8*	(Utilizar la dosis más alta según zona y condiciones climáticas. Consultar con el representante zonal).
Cucurbitáceas	2 a 3**	Aplicar con la máxima cantidad de flores abiertas.
Semillero de Brócoli, Bunching, Lechuga	2 a 3**	Aplicar en floración a toda la planta. Repetir a los 7-10 días.

*Se recomienda mezclar con 3 cc/L de **RUKAM Imw**.

Se recomienda mezclar con 1-2 cc/L de **RUKAM Imw.

***No se recomiendan aplicaciones vía riego, ya que no han mostrado efectividad.

RUKAM Kuaja® es seguro para los insectos polinizadores.
NO APLICAR en frutales (por eventuales problemas de fitotoxicidad).

Fecha de Fabricación:

Lote de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

