



Ingrediente activo:

Monoclorhidrato de Cartap*

Grupo Químico:

Nereitoxin (Tiocarbamatos)

Concentración:

50%

Formulación:

Polvo Mojable

Registro SAG:

N: 1.446

CARTAP 50% WP, ES UN INSECTICIDA SISTÉMICO DE AMPLIO ESPECTRO CON ACCIÓN DE CONTACTO E INGESTIÓN, DE ACCIÓN RÁPIDA Y DURADERA.

- ▶ Controla un amplio espectro de insectos succionadores, masticadores y minadores, en estado de larva y adulto.
- ▶ Grupo químico distinto que lo hace ser una eficaz alternativa en rotaciones de productos en base a piretroides.

! Moderadamente Peligroso (Grupo II)

▶ INSECTICIDA



- Realizar un **máximo de 5 aplicaciones por temporada** dejando pasar un **mínimo de 10 días** entre aplicaciones.

- No aplicar en floración, **tóxico para las abejas.**

Presentaciones:



500g



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Cebolla, Ajo, Chalota	Pulgones, Minadores, Trips, Langostinos, Polillas	100 – 150 g/100 L de agua o 1 – 1,5 kg/ha	Aplicar al detectar la plaga. Repetir cada 10 – 15 días. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.
Papas, Tomate, Ají, Pimiento	Pulgones, Polillas, Masticadores, , Langostinos, Trips, Minadores, Mosquita blanca	100 – 150 g/100 L de agua o 1 – 1,5 kg/ha	Aplicar al detectar la plaga. Repetir cada 10 – 15 días. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.
Repollo, Coliflor, Repollo Bruselas, Brócoli, Lechuga, Frejol, Pepino, Zapallo, Zapallo italiano, Melón, Sandía.	Polillas, Pulgones, Cusanos, Cuncunillas, Trips, Minadores, Mosquita blanca	100 – 150 g/100 L de agua o 1 – 1,5 kg/ha	Aplicar al detectar la plaga. Repetir cada 10 – 15 días. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.
Remolacha, Maravilla, Maíz	Cuncunillas, Pulgones, Langostinos, Minadores, Polillas, Trips	100 – 150 g/100 L de agua o 1 – 1,5 kg/ha	Aplicar al detectar la plaga. Repetir cada 10 – 15 días. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.
Trigo, Avena, Cebada, Arroz	Cuncunillas, Pulgones	100 – 150 g/100 L de agua o 1 – 1,5 kg/ha	Aplicar al detectar la plaga. Repetir cada 10 – 15 días. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.
Alfalfa, Trébol, Pasturas	Polillas, Cuncunillas, Minadores, Pulgones	100 – 150 g/100 L de agua o 1 – 1,5 kg/ha	Aplicar al detectar la plaga. Repetir cada 10 – 15 días. Utilizar la dosis más alta en casos de alta infestación de la plaga.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vaciar la cantidad necesaria de **CARTAP 50%WP** al estanque de aplicación, previamente llenado con agua hasta la mitad, con el agitador en funcionamiento. Posteriormente completar con agua hasta el volumen deseado. Mantener la agitación durante la aplicación.

VOLUMEN DE MOJAMIENTO

- 300 a 1.000 L/ha dependiendo de la cobertura vegetal. Realizar un máximo de 5 aplicaciones por temporada.

CARENCIAS

Cebolla, Ajo, Chalota, Papa, Tomate, Pimiento, Ají, Repollo, Coliflor, Brócoli, Repollo de bruselas, Lechuga, Frejol, Pepino, Zapallo, Zapallo italiano, Melón, Sandía, Remolacha, Maravilla, Maíz, Trigo, Avena, Cebada, Arroz, Alfalfal, Trébol y Pasturas: **7 días**.

COMPATIBILIDAD/INCOMPATIBILIDAD

- **CARTAP 50% WP es compatible** con la mayoría de insecticidas de uso común, pero es incompatible con los insecticidas preparados de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

- A las dosis y usos indicados, no produce fitotoxicidad. **No aplicar en floración, tóxico para las abejas.**

TIEMPO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada luego de 24 horas de realizada la aplicación. No permitir el ingreso del ganado luego de 7 días de realizada la aplicación.