

cortador[®] FULL

Herbicida Sistémico



Ingrediente activo:

Glifosato isopropilamonio
Glifosato potasio

Grupo Químico:

Organofosfonato

Concentración y formulación

607 g/L; Concentrado Soluble (SL)

Toxicidad:

Grupo III
(Producto poco peligroso)

Registro SAC:

N° 3.681

CORTADOR[®] FULL ES UN HERBICIDA SISTÉMICO, NO SELECTIVO, RECOMENDADO PARA EL CONTROL POST EMERGENTE DE MALEZAS GRAMÍNEAS, CIPERÁCEAS Y DE HOJA ANCHA EN FRUTALES, VIÑAS, KIWIS Y PLANTACIONES FORESTALES. ASÍ COMO EN CERO Y MÍNIMA LABRANZA, PREPARACIÓN DE SUELOS, BARBECHOS QUÍMICOS Y BORDES DE ACEQUIAS, TAL COMO SE INDICA EN EL CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO.

- ▶ Herbicida sistémico post emergente no específico para control total de malezas de hoja ancha y angosta.
- ▶ Combinación de dos sales de glifosato altamente soluble en agua, que permite una rápida absorción y traslocación por las hojas y tallos de las malezas a controlar.
- ▶ Posee una rápida respuesta de control.



▶ HERBICIDA

Presentación:



1L, 5L, 20L





CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIÓN TERRESTRE

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
FRUTALES: Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Durazno, Guindo, Nectarino, Manzano, Membrillo, Peral, Kiwis, Olivo, Nogal, Pistacho, Avellano europeo, Pecano, Palto, Chirimoyo, Mango, Lúcumo, Naranja, Limón, Clementina, Mandarina, Pomelo, Tangelo.	MALEZAS ANUALES Avenilla (<i>Avena fatua</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Ballica (<i>Lolium multiflorum</i> y <i>L. perenne</i>), Bledo (<i>Amaranthus spp.</i>), Bromo (<i>Bromus spp.</i>), Chamico (<i>Datura stramonium, D. ferox</i>), Cola de zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa crusgalli</i>), Manzanilla (<i>Chamomilla suaveolens</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Pega-pegas (<i>Setaria verticillata</i>), Pata de pollo (<i>Polygonum aviculare</i>), Mostacilla (<i>Sisymbrium, officinale</i>), Vulpia (<i>Vulpia bromoides</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleraceae</i>)	1,5 – 3,0	Aplicar cuándo las malezas se encuentran en los primeros estados de crecimiento, con 2ª – 6ª hoja, hasta tener 15 – 20 cm de altura. Usar dosis más altas con malezas desarrolladas.
VIDES: Vid de mesa, Vid vinífera,	Bolsita del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Mostacilla (<i>Sisymbrium officinale</i>), Yuyo (<i>Brassica rapa, Rapsitrum rugosum</i>), Rábano (<i>Raphanus spp.</i>), Quinguilla (<i>Chenopodium spp.</i>), Porotillo (<i>Biloderdickya convolvulus</i>), Suspiro (<i>Ipomoea purpurea</i>)	2,0 – 4,0	Aplicar cuándo las malezas se encuentran en los primeros estados de crecimiento, con 2ª – 6ª hoja. Usar dosis más altas con malezas desarrolladas.
FRUTALES MENORES: Arándano, Mora, Zarzaparrilla, Frambueso, Frutilla, Cranberry y Grosellero	MALEZAS PERENNES Pasto quila (<i>Agrostis capillaris</i>), Pasto cebolla (<i>Arrhenatherum elatius</i>)	1,5 – 3,0	Aplicar sobre malezas en pleno crecimiento. Usar dosis más altas con malezas desarrolladas.
CERO Y MÍNIMA LABRANZA: Raps, Cabada, Avena, Centeno, Trigo, Triticale, Maíz, Maravilla y Soya.	Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>), Falso té (<i>Bidens aurea</i>), Siete venas (<i>Plantago lanceolata</i>), Chépica (<i>Paspalum paspalodes</i>)	2,0 – 4,0	Aplicar sobre malezas en pleno crecimiento, con 25 a 35 cm de altura. Usar dosis más altas con malezas desarrolladas.
PLANTACIONES FORESTALES: Pino insignis, Pino ponderosa, Pino oregón, Eucaliptus nitens, Eucaliptus grandis, Eucaliptus globulus, Araucaria, Coigüe, Mañío, Lingüe.	Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), Chufa (<i>Cyperus spp.</i>), Galega (<i>Galega officinalis</i>), Junquillo (<i>Juncus procerus</i>), Carrizo (<i>Phragmites communis</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>), Suspiro blanco (<i>Calystegia sepium</i>)	4,0 – 6,0	Aplicar sobre malezas en pleno crecimiento. Usar dosis más altas con malezas desarrolladas.
REGENERACIÓN DE PRADERAS: Alfalfa, Trébol, Ballica, Festuca, Falaris y sus mezclas.	MALEZAS ARBUSTIVAS Beldo (<i>Peumus boldus</i>), Zarzamora (<i>Rubus sp.</i>), Mayo (<i>Sophora macrocarpa</i>), Maqui (<i>Aristotelia chilensis</i>), Roble (<i>Nothofagus obliqua</i>), Retamilla (<i>Teline monspesulana</i>), Litre (<i>Lithrea caustica</i>), Fuínque (<i>Lomatia ferruginea</i>), Palqui (<i>Cestrum parqui</i>), Brea o Peril (<i>Pluchea absinthioides</i>), Ulex (<i>Ulex europaeus</i>).	4,0 – 10,0	Aplicar sobre follaje tierno en activo crecimiento o sobre el rebrote de los arbustos cortados. Usar dosis más alta en sobre árboles más desarrollados.

Preparación:

- Agregar la cantidad recomendada de **Cortador® Full** al estanque de preparación a medio llenar con agua limpia y con equipo de agitación en funcionamiento. Luego, completar con el volumen requerido.

Modo de aplicación:

- La aplicación se puede realizar con equipos pulverizadores de mochila o terrestre con las boquillas que correspondan a cada caso. El mojado debe ser idealmente de 80 a 120 L/ha y no superior a 150 L/ha. Realizar las aplicaciones sobre malezas en activo crecimiento, y en buenas condiciones de humedad del suelo y ambiente. No aplicar sobre malezas cubiertas de tierra; no aplicar con viento mayor a 15 km/h y no aplicar si se pronostican lluvias dentro de 48 horas posteriores a la aplicación. Evitar mojar las partes verdes de troncos sin lignificar. Después de la aplicación de **Cortador® Full** y antes de una aradura o rastraje se debe esperar 3 a 5 días para asegurar una buena translocación del producto.
- El momento ideal de control en malezas perennes es próximo o durante la floración, y para malezas anuales en estadio joven hasta formación de 2 macollas. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por período productivo, con un intervalo de 45 días, dependiendo de la densidad de malezas.

Incompatibilidad

- **Cortador® Full** es compatible con otros productos fitosanitarios de uso corriente.

Efectos sobre el cultivo siguiente

- **Cortador® Full** no presenta efectos sobre los cultivos siguientes, si es utilizado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

Carencia:

- No corresponde fijar carencias por el modo y momento de uso del producto.

