

cortador®

Herbicida Sistémico 48% SL



Importado y distribuido por:
Point Chile S.A.
Av. Apoquindo 4615, of. 1401,
Las Condes, Santiago, Chile.
www.point.cl

Fabricado por:
Point Agro-China Ltd.
Wan Shi Town Yixing City,
Jiangsu, 214217, PR China.

CORTADOR® 48 SL
herbicida sistémico, no
selectivo para el control
post emergente de malezas
gramíneas, ciperáceas y de
hoja ancha en sitios industriales,
orillas de camino, áreas no
cultivadas, bordes de acequias.



Lea atentamente la
etiqueta antes de
usar el producto.

No inflamable,
No corrosivo,
No explosivo

VENTA GENERAL
Registro ISP: P-910/21

Fecha de Vencimiento:

Número de Lote:

500 cc
CONTENIDO NETO
CONCENTRADO SOLUBLE 48%

cortador

Herbicida Sistémico 48% SL

Cortador® 48% SL es un herbicida no selectivo recomendado para el control de malezas anuales y perennes, gramíneas, hojas anchas y ciperáceas post emergentes. No posee efecto residual significativo en el suelo.

COMPOSICIÓN:

Glifosato-isopropilamonio(*) 48% p/v (480 g/l)

CAS 1071-83-6

Coformulantes c.s.p., 100% p/v (1L)

(*) Sal isopropilamónica de N-(fosfonometil) glicina (equivalente a 36% p/v (360 G/L) de ácido de glifosato)

Grupo Químico: Aminas ácidas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Durante la manipulación y aplicación utilizar guantes.
- No comer, beber ni fumar. No inhalar los vapores o aspersiones del producto.
- Evitar la ingestión del producto, el contacto con la piel y los ojos.
- No contaminar alimentos.
- No aplique directamente a cursos de agua, tóxico para organismos acuáticos.
- No permitir la entrada de personas ni animales al área de aplicación.
- Mantener alejado de niños y animales domésticos.
- Guardar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en lugar fresco, seco, bien ventilado y seguro bajo llave.
- Una vez utilizado, destruir el envase en forma segura.

PRIMEROS AUXILIOS:

Síntomas de intoxicación: Irritación de la piel y tracto respiratorio superior, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón, inclusive el pelo y debajo de las uñas. Retire la ropa contaminada.

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con abundante agua y 15 minutos. Manténgase los párpados abiertos para lavar la superficie del ojo. Consulte a un médico si se desarrollan síntomas.

Inhalación: Remover al aire fresco, inmediatamente. Si el paciente no respira, dar respiración artificial. Si la dificultad para respirar continúa, dar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente si se desarrollan síntomas.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Consiga ayuda médica inmediatamente.

Antídoto: No posee antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia:

Rita Chile: +56 22777 1994 (24 horas)

Point Chile: +56 22747 1677 (horario oficina)

INSTRUCCIONES DE USO

Ideal para el control de:

Gramíneas anuales: Pata de gallina, Hualcacho, Piojillo, Avenilla, Poa, Cola de Zorro.

Gramíneas perennes: Chépica o pasto quila y pasto cebolla.

Hoja Ancha anuales: Ortiga, Sanguinaria, Verdolaga, Amor seco, Cardo, Chamico, Yuyo, Manzanilla.

Otras malezas: Achicoria, Falso té, Correhuela, Rábano y siete venas.

Dosificación: Para aplicaciones dirigidas o desmanches con equipo tipo mochila, preparar una solución de 250 cc en 10 litros de agua, para tratar aproximadamente 100-120 m² de superficie. Dirigir la aplicación a las hojas de la maleza, procurando una buena cobertura, evitando la deriva. No ingresar hasta 12 horas después de realizada la última aplicación.

Cortador® 48% SL secará toda aquella planta verde que entre en contacto con la solución. Por tanto, si desea aplicar el producto en pastos o malezas que están cerca de plantas que desee conservar, debe tener cuidado de no dirigir la aplicación hacia estas plantas. Tome precauciones correspondientes para evitar la deriva del producto, como realizar las aplicaciones sin viento, usar la pantalla protectora y/o boquillas antideriva. Los mejores resultados se obtienen en malezas en activo crecimiento, los síntomas en los brotes incluyen amarillamiento y marchitamiento, desde el tejido nuevo al más viejo.

Los efectos visibles normalmente comienzan entre los 3 a 10 días, dependiendo de las temperaturas, tardando unas 2 a 3 semanas en secarse totalmente. No corresponde fijar carencias.

Cortador® 48% SL es compatible con la mayoría de los herbicidas, y con surfactantes no iónicos y siliconados de todo tipo.



Importado y distribuido por:

Point Chile S.A.
Av. Apoquindo 4615, of. 1401, Las Condes,
Santiago, Chile.
www.point.cl

Fabricado por:

Point Agro-China Ltd.
Wan Shi Town Yixing City,
Jiangsu, 214217, PR China.



CUIDADO

