

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Cada vez que se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y lejos de zonas de alimentación. **BIOSTIV®** al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas. tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD

Se sugiere aplicar **BIOSTIV®** sin mezclar con otros productos. En riego localizado, dentro del mismo período de riego, no debe aplicarse antes o después de aplicaciones de ácidos (fosfórico, cítrico). No es compatible con micro-elementos, cobre, azufre, ácidos, aceites y surfactantes. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En fertirrigación **BIOSTIV®** debe ser diluido en agua antes de inyectarlo al sistema de riego, realizando la aplicación preferentemente en el último tercio del riego.

NOTA AL COMPRADOR

Descargo de responsabilidades: Los factores que influyen en la aplicación del producto son variables. Entre ellos la calidad del agua, la calibración de los equipos, la dosis efectivamente aplicada, las mezclas con otros productos, el almacenamiento, las condiciones meteorológicas y la fertilización realizada. Por lo anteriormente indicado, no podemos garantizar el efecto y la selectividad del producto bajo todas las circunstancias y, por lo tanto, no seremos responsables de las pérdidas directas, indirectas o accidentales que se deriven de ello. En caso de duda, los usuarios deberán realizar las pruebas pertinentes o consultar a nuestro personal técnico antes de utilizar el producto.

biostiv®

CONCENTRADO SOLUBLE (SL) BIOESTIMULANTE

BIOSTIV® es un concentrado soluble en base aminoácidos, Ácido húmico y ácidos fúlvicos que produce un fuerte estímulo al desarrollo, formación y vigor de las raíces en condiciones de suelo que limitan el crecimiento radicular.

Composición	%p/v
Aminoácidos totales	23,1
Aminoácidos libres	9,6
Ácido Húmico	21,6
Ácido Fúlvico	14,5

Metales Pesados	Cr	Cr VI	Cd	As	Pb	Hg	Ni	Cu	Zn
ppm	ND*	ND*	ND*	0,31	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH: 7,22
Densidad: 1,16 g/ml

*ND= No detectado

Fabricado y Distribuido por:

POINT CHILE S.A.

Evaristo Lillo 48, of. 1401, Las Condes,

Santiago, Chile - Fono: +56 2238 49840

E-mail: chile@pointamericas.com

www.point.cl



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis* L/ha	Aplicaciones
Nogal, Avellano europeo	5 a 7	Al inicio del primer peak de crecimiento de raíces, repetir en 2 semanas. En 2° peak de crecimiento de raíces, 2 aplicaciones.
Durazno, Almendro, Ciruelo, Nectarino, Damasco	4,5 a 5	2 aplicaciones en el peak de crecimiento de raíces de primavera (una al inicio y otra dos semanas después). 1 aplicación en post-cosecha.
Cerezo, Guindo	5 a 6	Al inicio del 1° peak de crecimiento de raíces y repetir en 2 semanas. En post-cosecha 2 aplicaciones.
Paltos, Cítricos, Olivos	6 a 7	Al inicio del peak de crecimiento de raíces, repetir cada 30 días.
Manzanos, Perales	4,5 a 5	Al inicio del peak de crecimiento de raíces y repetir cada 3 semanas. En peak post-cosecha 1 aplicación.
Arándano	3 a 3,5	2 a 3 aplicaciones cada 15 días, a partir del primer peak de crecimiento radicular y 1 aplicación en post-cosecha.
Uva de mesa	5 a 6	2 aplicaciones a partir del peak de crecimiento de raíces post brotación y 1 a 2 aplicaciones a partir del peak de crecimiento de post-cosecha.
Vid vinífera	4 a 5	
Plantaciones nuevas	2,5 a 3	Al inicio del crecimiento de raíces y repetir cada 2 semanas durante la primavera.
Tomate indeterminado	7 a 9	Desde el primer riego o desde el segundo racimo floral emitido, repetir cada 3 semanas.
Tomate determinado	6 a 8	Desde el primer riego, repetir cada 10 días según respuesta de las plantas.
Frutilla	4 a 5	Aplicar 1 a 2 semanas después del trasplante, repitiendo cada 2 a 3 semanas.
Zapallo, Melón, Sandía	3 a 4	1 a 2 semanas después del trasplante, repitiendo cada 2 a 3 semanas según respuesta de las plantas.
Cebolla, Ajo	4 a 5	2 semanas después del trasplante, repetir en 3 semanas.
Otras hortalizas y cultivos de flores	3 a 4	1 a 2 semanas después del trasplante o siembra, repitiendo según respuesta de las plantas.

* Las aplicaciones sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Las dosis y la frecuencia requieren del diagnóstico profesional en terreno.

Fecha de Fabricación:

Lote de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Litro