

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol, guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Cada vez que se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recipientes secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y lejos de zonas de alimentación. **RUKALG®**, al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD

RUKALG® es compatible con todos los productos de la línea **RUKAM®** y la mayor parte de los productos fitosanitarios o abonos normalmente empleados. Sin embargo, antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. No usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactante.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar enérgicamente el envase de **RUKALG®** y pre-diluir la dosis en 5 a 6 partes de agua. Poner agua hasta la mitad del equipo aplicador, luego agregar la pre-dilución, agitar y agregar agua hasta completar la cantidad requerida. Mantener la agitación durante la aplicación.

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de esta etiqueta sobre la naturaleza y uso del producto anula cualquier otra información, ya sea escrita u oral.

RUKALG®

CONCENTRADO SOLUBLE (SL) MEZCLA BIOESTIMULANTE Y FERTILIZANTE

RUKALG® es un bioestimulante natural que favorece el crecimiento sostenido de las plantas en diferentes estados fenológicos. Está especialmente formulado para aplicaciones foliares en frutales, hortalizas y cultivos extensivos. Se recomienda su uso regular durante el ciclo de crecimiento para maximizar la actividad fotosintética y mejorar la calidad de la cosecha, especialmente en períodos de estrés.

Composición	%p/v
Aminoácidos totales	6,9
Fósforo (P ₂ O ₅)	1,1
Potasio (K ₂ O)	4,1

Metales Pesados	Cr	Cr VI	Cd	As	Pb	Hg	Ni	Cu	Zn
ppm	ND*	ND*	ND*	1,4	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH: 7,3
Densidad: 1,1489 g/ml - Solubilidad en agua: 97,7%

*ND= No detectado

Fabricado y Distribuido por: **POINT CHILE S.A.**
Evaristo Lillo 48, of. 1401, Las Condes,
Santiago, Chile - Fono: +56 2238 49840
E-mail: chile@pointamericas.com
www.point.cl



Contenido Neto: 1 Litro

RECOMENDACIONES DE USO

Especie Frutal	Dosis* L/ha	Aplicaciones
Arándano, Frutilla, Frambueso, Mora	2 a 2,5	1 a 2 aplicaciones desde fruto cuajado.
Cerezo, Guindo	2,5 a 3	Desde pinta a cosecha 3 aplicaciones.
Durazno, Almendro, Ciruelo, Damasco	3 a 4	2 aplicaciones: en pre-flor y en floración.
Kiwi, Manzanos, Perales	3	2 a 3 aplicaciones desde fruto cuajado.
Paltos, Cítricos (Pomelo, Limonero, Naranja, Mandarino)	3	2 a 3 aplicaciones en brotación. 3 aplicaciones cada 20 días después de la caída fisiológica de los frutos.
Olivo	3	3 a 4 aplicaciones después de la caída fisiológica de los frutos.
Vid vinífera y de mesa con semilla	2,5 a 3	1 a 2 aplicaciones en brotación y repetir después de cuaja cada 20 días.
Vid de mesa sin semilla	3	1 a 2 aplicaciones en brotación y 2 desde la 1a de crecimiento (GA3)**
Nogal	3 a 4	2 aplicaciones después de 20% flor. 3 aplicaciones desde crecimiento de frutos.
Avellano Europeo	2 a 3	2 a 3 aplicaciones desde brotación.
Hortalizas de hoja	1,5 a 2	20 días después del trasplante y post cuaja. Repetir si fuera necesario.
Tomate, Ají, Pimiento, Sandía, Melón, Zapallo	2 a 2,5	20 días después del trasplante y post cuaja. Repetir si fuera necesario.
Ajo, Cebolla	2,5 a 3	Desde 20 días después del trasplante y en formación del bulbo.
Papa	2 a 3	2 a 3 aplicaciones después de la aporca (plantas de 25-30 cm.)
Remolacha	2,5 a 3	2 a 3 aplicaciones cada 15 días desde 6 hojas verdaderas.
Maíz	1 a 2	2 aplicaciones cada 15 días desde 4 a 6 hojas.

**En uva y otros frutales no aplicar por inmersión/deeping, ni con pitón dirigido a los racimos o frutos.
Vía riego: 3 a 5 L/ha en pre-flor y post-cosecha en frutales. 200cc/100L antes del trasplante en almárgicos. Inmersión de semillas y/o raíces: 2 a 3 L/100L de agua.

*Las dosis y la frecuencia, requieren del diagnóstico profesional en terreno, para establecer la necesidad de tratar la plantación o cultivo.

Lote de Fabricación:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento: