

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación, usar máscara con filtro, antiparras, overol, guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad.

Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso. **Cuando se mezcle o aplique con plaguicidas, se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos.**

RUKAM® Potasio, al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas.

COMPATIBILIDAD

RUKAM® Potasio es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM®**, salvo **RUKAM® Cobre**. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 4 días después. No usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **RUKAM® Potasio**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de esta etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra información, ya sea escrita u oral.

RUKAM® potasio

Líquido en solución
Concentrado Soluble (SL)

MEZCLA BIOESTIMULANTE Y FERTILIZANTE

RUKAM® Potasio incorpora el catión K⁺ junto con aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular al tejido vegetal en forma más rápida y con menor consumo energético, lo que es crucial en situaciones de estrés por factores externos y/o condiciones de alta exigencia productiva en frutales y hortalizas.

RUKAM® Potasio, al permitir la inmediata disponibilidad del catión K⁺, favorece todos los procesos que interviene en la formación del color, maduración y calidad de los frutos.

Composición	% p/v
Potasio (K ₂ O)	17,4
Aminoácidos totales	13,1
Aminoácidos libres	6,1

Metales Pesados	Cr	Cr VI	Cd	As	Pb	Hg	Ni	Cu
ppm	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*

Contaminantes microbiológicos	<i>E. coli</i>	<i>Salmonella sp</i>
	Ausencia	Ausencia

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH: 6,54

Densidad: 1.401 g/L - Solubilidad en agua: 99,3%

*ND= No detectado

Fabricado y Distribuido por: **POINT CHILE S.A.**
Evaristo Lillo 48, of. 1401, Las Condes,
Santiago, Chile - Fono: +56 2238 49840
E-mail: chile@pointamericas.com
www.point.cl



CONTENIDO NETO: 1 LITRO

RECOMENDACIONES DE USO

Frutales y Cultivo	Dosis* L/ha	Aplicaciones Foliars
Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro	3 a 3,5	Aplicar 3 a 4 veces, desde caída de pétalos.
Cerezo, Guindo	3 a 3,5	Desde fruto cuajado cada 10 días.
Vid de mesa y vinífera	2 a 3	3 a 4 aplicaciones desde inicio de brotación. En variedades de color, desde cierre de racimo en adelante.
Manzano, Peral, Nogal, Avellano europeo	3 a 4	3 a 4 aplicaciones cada 15 días desde caída de pétalos.
Cítrico, Palto, Olivo	3,5 a 4	Aplicaciones desde fruto cuajado, repetir cada 15-20 días.
Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla	1,5 a 2	Aplicaciones desde fruto cuajado, cada 10-15 días.
Acelga, Espinaca, Lechuga, Coliflor, Brócoli	2,5 a 3 (cc/L)	2 a 3 aplicaciones un mes después del trasplante.
Melón, Sandía, Zapallo	2 a 3 (cc/L)	3 a 4 aplicaciones desde fruto cuajado.
Tomate, Pimiento, Pepino	2 a 3 (cc/L)	Aplicaciones fruto formado, repitiendo cada 10-15 días
Papa	2 a 3 (cc/L)	2 a 3 aplicaciones después de la aporca (plantas de 25 a 30 cm)
Remolacha	2 a 2,5 (cc/L)	2 a 3 aplicaciones cada 15 días desde 6 hojas verdaderas
Ajo y cebolla	2 a 3 (cc/L)	2 a 3 aplicaciones un mes antes de la cosecha

Vía riego: 4 a 12 L/ha. La dosis y periodicidad dependen del tipo de suelo y el desarrollo radicular.

*Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y periodicidad dependen del diagnóstico profesional en terreno.

Lote de Fabricación:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento: