

INSTRUCCIONES DE USO

T-BUZOL® 430 SC es un fungicida sistémico de largo efecto residual, cuya acción consiste en inhibir la biosíntesis del ergosterol, componente esencial de la membrana celular de los hongos. **Cuadro de Instrucciones de Uso:**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Vides de mesa, viníferas y pisqueras	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>); Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)	60 – 70 cc/hL ó 0,6 – 1,0 L/ha	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada con un intervalo de 10 días, desde inicio de floración hasta cierre de racimos, según condiciones de infestación. Aplicar la dosis más alta en condiciones de alta infestación de la enfermedad. Utilizar un mojamiento de 1.000 – 1.500 L de agua/ha., dependiendo de la cobertura vegetal.
Duraznos, Nectarinos, Cerezos, Damascos, Ciruelos, Almendros	Tizón de la flor (<i>Monilinia laxa</i>); Pudrición morena (<i>Monilinia fructicola</i>); Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	30 – 40 cc/hL ó 0,5 L/ha	Realizar una aplicación en estado de botón, seguida de una segunda en estado de plena flor. Aplicar la concentración mayor en condiciones de alta infestación de la enfermedad. Para pudrición morena, realizar hasta 2 aplicaciones preventivas por temporada en pre-cosecha con intervalos de 7 días. Utilizar la concentración más alta y resguardar los días de carencia. Mojamiento de 1.000 a 1.500 L de agua/ha., dependiendo de la cobertura vegetal.
	Oídio (<i>Podosphaera pannosa</i>)	20 – 35 cc/hL ó 0,3 – 0,5 L/ha	Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, desde estado de caída de pétalos hasta endurecimiento de carozo, con un intervalo de 15 días según existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un mojamiento de 1.500 L de agua/ha. Aplicar la dosis más alta en condiciones de alta infestación de la enfermedad.
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>); Pudrición ácida (<i>Geotrichum candidum</i>)	60 – 70 cc/hL	Realizar 1 aplicación en pre-cosecha para disminuir inóculo en campo, respetando los períodos de carencia. Utilizar un mojamiento de 1.500 L de agua/ha.
Arándanos, Frambuesa, Frutillas, Moras	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 – 70 cc/hL ó 0,6 – 1,0 L/ha	Aplicar hasta 2 veces por temporada cada 15 días de forma preventiva durante floración al existir condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un mojamiento de 1.000 a 1.500 L de agua/ha.
Arándanos	Enfermedades de la madera (<i>Neofusicoccum nonquaesitum</i> ; <i>N. parvum</i>)	50 cc/hL ó 0,3 L/ha	Aplicar de manera preventiva a caída de hojas, poda y brotación. Utilizar un mojamiento de 600 L de agua/ha.
Plantaciones de Pino y Eucaliptus	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 – 75 cc/hL	Realizar hasta 6 aplicaciones cada 7 a 10 días de manera preventiva cuando existan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un mojamiento de 1.000 a 1.500 L de agua/ha., dependiendo del estado de desarrollo de las plantas. Aplicar la dosis más alta en condiciones de alta infestación de la enfermedad.
Viveros de Pino y Eucaliptus	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 – 70 cc/hL	Realizar hasta 2 aplicaciones cada 15 días de manera preventiva cuando existan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un mojamiento de 200 de agua/ha. Aplicar la dosis más alta en condiciones de alta infestación de la enfermedad.

Cuadro de Instrucciones de Uso Aplicación Aérea

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Plantaciones y viveros de Pino y Eucaliptus	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75 – 1,0 L/ha	Realizar hasta 3 aplicaciones de manera preventiva cuando existan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un mojamiento de 60 L de agua/ha. Aplicar la dosis más alta en condiciones de alta infestación de la enfermedad.

PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA

Preparación de la Mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad requerida de T-Buzol® 430 SC, luego completar con agua hasta el nivel deseado, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

Condiciones en la que el producto puede o no, ser utilizado: Aplicar al follaje con bomba de espalda, nebulizadora, pitón, barra, asegurando un buen cubrimiento del follaje y frutos.

Se recomienda no aplicar T-Buzol® 430 SC bajo condiciones meteorológicas desfavorables (viento sobre los 8 m/s y lluvias sobre 50-60 mm) o con equipos de fumigación, que podría dar lugar a problemas de deriva a los cultivos adyacentes, praderas o ganado.

No aplicar en horas de calor o sobre follaje humedecido.

Precauciones de uso para protección de las abejas:

- Retirar colmenas previo a la aplicación y no regresarlas al área de tratamiento antes de 48 a 72 horas después de la aplicación.
- Aplicar al atardecer, temprano en la mañana, en horarios de baja actividad de las abejas, evitando la deriva.
- Se recomienda, antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que están en floración al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal presente alrededor del cultivo.
- No aplicar con viento superior a 10 km/hora para evitar la dispersión.
- No aplicar con temperaturas superiores a 30°C.

Compatibilidad: T-Buzol® 430 SC es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, si existen dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

Incompatibilidad: Se recomienda aplicar T-Buzol® 430 SC solo y no en mezclas. No aplicar con productos formulados como emulsión concentrada. No mezclar con productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: T-Buzol® 430 SC no es fitotóxico cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

Efecto Sobre el Cultivo Siguiente: T-Buzol® 430 SC no presenta efectos sobre el cultivo siguiente.

Carencias: Frutilla: **30 días.** Almendro: **25 días.** Arándano, Frambuesa y Mora: **24 días.** Durazno, Nectarino, Cerezo, Damasco, Ciruelo, Uva de mesa, Uva vinífera, Uva pisquera: **7 días.**

Tiempo de reingreso al área tratada: Se recomienda no ingresar hasta 12 horas después de aplicado. No corresponde restringir el ingreso a animales, ya que el producto no es utilizado en cultivos destinados a su alimentación.