


Insecticida



INVICTO® 50CS



Invicto® 50 CS es un insecticida piretroide de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, con un alto poder de volteo y efectos de repelencia y acción antialimentaria. Está indicado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores y picadores-chupadores en frutales, cultivos, hortalizas, berries, praderas, empastadas y plantaciones forestales. Su formulación en suspensión de encapsulado (CS) permite que el ingrediente activo comience a liberarse desde la aplicación y continúe durante aproximadamente 1 a 2 horas. Presenta buena adherencia al follaje y resistencia a lluvias que ocurran entre 4 y 6 horas después de la aplicación.

Invicto® 50 CS

Insecticida



Acción:
Insecticida



Formulación:
Suspensión de
Encapsulado



Presentación:
1 Litro



Registro SAG:
N° 1.833

Modo de aplicación: Invicto® 50 CS se puede aplicar con equipo terrestre o aéreo de alto o bajo volumen, asegurando un buen cubrimiento del follaje del cultivo. No aplicar con viento superior a 10 km/h para evitar la deriva, a horas de calor, ni cuando se pronostican lluvias dentro de hasta 6 horas. Utilizar la dosis menor con baja presión de la plaga y la dosis mayor en casos de presión media a alta.

Recomendaciones de uso y dosis:

Cultivos	Plagas	Dosis (cc/hL)	Observaciones
Damasco, Durazno, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Guindo, Almendro	Pulgones: <i>Appelia tragopogonis</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Brachycaudus schartzi</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> , <i>Myzus persicae</i> ; Polilla Oriental: <i>Grapholita molesta</i> .	10 - 20	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 30 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 1.500 L de agua/ha.
	Chape del cerezo: <i>Caliroa cerasi</i> ; <i>Eulias:</i> <i>Proeulia spp.</i>	20 - 40	
Cerezo, Ciruelo, Pluot, Plumcot, Nectarino, Duraznero, Damasco	Mosca de alas manchadas: <i>Drosophila suzukii</i>	20	Se recomienda realizar la aplicación tan pronto se detecte la presencia de la plaga desde el estado de pinta. Realizar un máximo de 2 aplicaciones en la temporada con un intervalo de 12 días. Importante alternar con productos que posean distinto modo de acción. Utilizar un mojamiento de 1.500 L de agua/ha.
Manzano, Peral, Membrillo	Polilla de la Manzana: <i>Cydia pomonella</i>	10 - 20	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 30 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 2.000 L de agua/ha.
	Eulias: <i>Proeulia spp.</i> ; Psílido del peral: <i>Cacopsylla bidens</i> ; Eulias: <i>Proeulia spp.</i> ; Gusanode los penachos: <i>Orgia antiqua</i>	20 - 40	
Nogal	Polilla de la Manzana: <i>Cydia pomonella</i> .	20	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 30 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 3.000 L de agua/ha.
Uva de mesa, Uva pisquera, Vid vinífera	Eulias: <i>Proeulia spp.</i>	20 - 40	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar la concentración más alta con larvas mayores a 0,5 cm de largo. Aplicar hasta 2 veces por temporada a intervalos de 10 y 30 días. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 1.000 L de agua/ha.
Palto	Trips del palto: <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> .	10	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 20 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 3.000 L de agua/ha, asegurando un buen mojamiento de la parte baja e interior de la copa.
Arándanos, Frambuesas, Moras, Frutillas, Zarzaparrillas	Mosca de alas manchadas: <i>Drosophila suzukii</i>	20	Se recomienda realizar la aplicación tan pronto se detecte la presencia de la plaga desde el estado de pinta. Realizar un máximo de 2 aplicaciones en la temporada con un intervalo de 12 días. Importante alternar con productos que posean distinto modo de acción. Utilizar un mojamiento de 1.000 - 1.500 L de agua/ha. Para Frutillas mojar con 800 - 1.000 L de agua/ha., dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora	Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Capitophorus spp.</i> , <i>Cavariella aegopodi</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Acyrtosiphon pisum</i> . Larvas minadoras: <i>Liriomyza sativae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Parathous exitiosus</i> , <i>Empoasca curveola</i> ; Trips: <i>Frankliniella cestrum</i> , <i>Thrips tabaci</i> ; Burritos: <i>Naupactus spp.</i> , <i>Pantomorus spp.</i> ; Cuncunillas: <i>Agrotis spp.</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Copitarsia spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Melittia cucurbitae</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> ; Pilmes: <i>Epicauda pilme</i> ; Polillas: <i>Tuta absoluta</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> , Chinche verde: <i>Nezara viridula</i> .	150 - 250 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. En berries hacer máximo 2 aplicaciones en la temporada, separadas por 7 a 21 días. Mojamiento de 1.000 a 1.500 L de agua/ha, dependiendo del desarrollo del cultivo. En cebolla, ajo, brócoli, coliflor, tomate y pimiento hacer máximo 4 aplicaciones por temporada, separadas 7 a 21 días. Para los demás cultivos hacer máximo 2 aplicaciones en la temporada, separadas entre 7 a 21 días. En leguminosas y hortalizas utilizar un mojamiento de 300 a 800 L de agua/ha, dependiendo de su desarrollo.
Ajo, Betarraga, Cebolla, Brócoli, Coliflor, Zanahoria, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo Arveja, Haba, Lenteja, Poroto, Soya, Tomate, Pimiento, Papa		150 - 200 cc/ha	

Visítanos en



www.point.cl

in



f

Invicto® 50 CS

Insecticida

Recomendaciones de uso y dosis:

Cultivos	Plagas	Dosis (cc/haL)	Observaciones
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	Cuncunillas: <i>Dalaca spp.</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia spp.</i> ; Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Diuraphis noxia</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Schizaphis graminum</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Máximo 3 aplicaciones en la temporada, separadas 10 a 30 días. Utilizar un mojamiento mínimo de 100 L de agua/ha, dependiendo del tipo de cultivo y estado de desarrollo del cultivo.
Maíz	Gusanos cortadores: <i>Agrotis bilitura</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Elasmopalpus lignosellus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Spodoptera frugiperda</i> .	250 - 350 cc/ha	Aplicar luego de la emergencia del cultivo, de manera curativa, dirigido a la hiler, preferentemente al atardecer. Utilizar un mínimo de 200 L de agua/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada a intervalos de entre 3 a 7 días.
	Gusano del choclo: <i>Helicoverpa zea</i>	200 - 250 cc/ha	Aplicar 2 días después de observar el 5% de estilos. Repetir 4 días después de la primera aplicación y 7 días después de la segunda aplicación.
Raps, Remolacha, Maravilla	Cuncunillas: <i>Plutella xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Plusia spp.</i> ; Pilmes: <i>Epicauda pilme</i> ; Pulgones: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis brassicae</i> , <i>A. fabae</i> , <i>A. gossypii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Empoasca curveola</i> , <i>Parathanus exitiosus</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar la dosis mayor en situaciones de alta presión de plagas. Aplicar hasta 2 veces por temporada, a intervalos de entre 10 y 30 días, con un mínimo de 100 L de agua/ha, dependiendo del equipo de aplicación, tipo de cultivo y estado fenológico.
Lechuga, acelga, achicoria, espinaca	Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Capitophorus spp.</i> , <i>Cvariella aegopodi</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza sativae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Paraethanus exitiosus</i> , <i>Empoasca curveola</i> ; Trips: <i>Frankiniella cestrum</i> , <i>Thrips tabaci</i> ; Burritos: <i>Naupactus spp.</i> , <i>Pantomorus spp.</i> ; Cuncunillas: <i>Agrotis spp.</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Copitarsia spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Melittia cucurbitae</i> , <i>Trichoplusia ni</i> ; Pilme: <i>Epicauda pilme</i> ; Chinche verde: <i>Nezara viridula</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Hacer un máximo de 2 aplicaciones en la temporada, separadas entre 7 a 21 días. Utilizar un mojamiento de 300 a 800 L de agua/ha, dependiendo de su desarrollo.
Brócoli, Coliflor, Repollo, Repollo de Bruselas, Kale, Pak-choi, Rúcula, Raps	Chinche pintada (<i>Bagrada hilaris</i>)	250 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Hacer un máximo de 2 aplicaciones en la temporada, separadas entre 7 a 21 días. Utilizar un mojamiento de 300 a 800 L de agua/ha, dependiendo de su desarrollo.
Achicoria industrial	Cuncunillas: <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Plusia spp.</i> ; Pilme: <i>Epicauda pilme</i> ; Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>A. gossypii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Empoasca curveola</i> , <i>Parathanus exitiosus</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar la dosis mayor en situaciones de alta presión de plagas. Aplicar hasta 2 veces por temporada, a intervalos de entre 10 y 30 días, con un mínimo de 100 L de agua/ha, dependiendo del equipo de aplicación, tipo de cultivo y estado fenológico.
Pinos	Polilla del brote: <i>Rhyacionia buoliana</i> .	50 cc/ha	Aplicar en viveros cuando se detecten los primeros vuelos de adultos. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada a intervalos de entre 7 a 21 días.
Praderas (ballicas, festucas, avena, pasto ovillo y miel, trébol blanco y rosado, Vicia y alfalfa)	Cuncunilla negra: <i>Dalaca spp.</i>	150 - 200 cc/ha	Aplicar temprano en la temporada, con larvas de 0,5 – 1 cm de largo en praderas talajeada o después de un corte, con altura máxima de 5 – 10 cm. Utilizar la dosis más alta en casos de alta presión de la plaga y la dosis más baja con baja presión. Utilizar un mojamiento de 600 L de agua/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, con un intervalo de 10 a 30 días.

Invicto® 50 CS

Insecticida

Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicación Aérea:

Cultivos	Plagas	Dosis (cc/ha)	Observaciones
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	Cuncunillas: <i>Dalaca spp.</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia spp.</i> ; Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Diuraphis noxia</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Schizaphis graminum</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Máximo 3 aplicaciones en la temporada, separadas 10 a 30 días. Mojamiento mínimo de 40 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Maíz	Gusano del choclo: <i>Helicoverpa zea</i>	200 - 250 cc/ha	Aplicar al observar los primeros adultos. Utilizar dosis mayor bajo alta presión de la plaga. Aplicar hasta 4 veces por temporada, separadas 10 a 30 días, con mínimo de 40 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Raps, Remolacha, Maravilla	Cuncunillas: <i>Plutella xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Plusia spp.</i> ; Pilmes: <i>Epicauda pilme</i> ; Pulgones: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis brassicae</i> , <i>A. fabae</i> , <i>A. gossypii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Empoasca curveola</i> , <i>Parathanus exitiosus</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar dosis mayor bajo alta presión de las plagas. Máximo 2 aplicaciones por temporada, separadas 10 a 30 días, con mínimo de 40 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico.
Pinos	Polilla del brote: <i>Rhyacionia buoliana</i>	150 cc/ha	Aplicar en viveros cuando se detecten los primeros vuelos de adultos. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada a intervalos de entre 7 y 21 días. Utilizar 12 L agua/ha.
Praderas (ballicas, festucas, avena, pasto ovillo y miel, trébol blanco y rosado, Vicia y alfalfa)	Cuncunilla negra: <i>Dalaca spp.</i>	150 - 200 cc/ha	Aplicar temprano en la temporada, con larvas de 0,5 – 1 cm de largo en praderas talajeada o después de un corte, con altura máxima de 5 – 10 cm. Utilizar la dosis más alta en casos de alta presión de la plaga y la dosis más baja con baja presión. Utilizar un mojamiento de 40 L de agua/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, con un intervalo de 10 a 30 días.

Esta Información es una referencia, favor remitirse al dato oficial de la etiqueta que está publicado en www.point.cl o contactarse a nuestro departamento técnico a chile@pointamericas.com. Información actualizada de este material 10/2026.

