

# QUILATE® Plus 45% WP

## INSECTICIDA

### POLVO MOJABLE (WP)

#### Composición:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Acetamiprid*          | 40,0 % p/p (400 g/kg) |
| Lambda-cihalotrina**  | 5,0% p/p (50 g/kg)    |
| Coformulantes c.s.p., | 100% p/p (1 kg)       |

\* (E)-N'-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N<sup>2</sup>-ciano-N<sup>1</sup>-metilacetamida - \*\* Mezcla racémica del par enantiomérico B de la cihalotrina: (1S,3S)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)-α-ciano-3-fenoxibencilo y (1R,3R)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-α-ciano-3-fenoxibencilo.

**Quilate® Plus 45% WP** es un insecticida sistémico y de contacto, recomendado para el control de plagas mordedoras y picador - succionadoras como polillas, pulgones, mosquitos blancos y trips indicadas en el cuadro de instrucciones de uso. **Quilate® Plus 45% WP** actúa por contacto e ingestión con un largo efecto residual.

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - CORROSIVO**

**“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°1.917**

#### Fabricado por:

Point Agro-China Ltd.  
Wan Shi Town Yixing City, Jiangsu 214217,  
P.R. China

#### Importado y Distribuidor por:

Point Chile S.A.  
Av. Apoquindo 3910, piso 7, oficina 701, Santiago, Chile.  
Fono: +56 2 2384 9840



**Contenido Neto: 250 g**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** El ingrediente activo Acetamiprid pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides y el ingrediente activo Lambda-cihalotrina pertenece al grupo de los Piretroides.

**Precauciones de Uso:** Durante la preparación utilizar equipo de protección completo: traje impermeable, botas de goma, guantes largos impermeables, gafas y respirador NIOSH/MSHA. Durante la aplicación utilizar equipo de protección completo: overol, botas de goma, guantes largos impermeables, respirador NIOSH/MSHA. Proteger la cabeza. No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. No inhalar los vapores o aspersiones del producto. No aplicar contra el viento. Evitar la ingestión del producto, el contacto con la piel y los ojos. No contaminar alimentos, semillas, forrajes, ni cursos de agua. No permitir la entrada de terceras personas ni animales en áreas que están siendo sometidas a tratamiento o manipulación del producto. Evitar la entrada de animales domésticos en sitios que están siendo tratados.

**Síntomas de Intoxicación:** Fatiga, reducción de la actividad motora, anomalías al caminar, disminución de la temperatura, dilatación de pupilas, y una posible reducción de la capacidad respiratoria.

**Primeros Auxilios: INGESTIÓN: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por

la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **INHALACIÓN:** Se debe trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si no respira se debe suministrar respiración artificial. Trasladar a un centro asistencial.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Tratar los síntomas. Chequear la presión arterial y el pulso frecuentemente, ya que puede desarrollar bradicardia e hipotensión. Dé respiración artificial si hay síntomas de parálisis respiratoria. El tratamiento indicado es sintomático y de soporte.

**Información Ecotoxicológica: MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS;** Nocivo para lombrices de tierra; Moderadamente tóxico para aves y peces; Altamente tóxico para microcrustáceos y algas. Nos asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: RITA CHILE: +56 22 777 1994 - POINT CHILES.A. : +56 2 2384 9840.**

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”**

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**

**“INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y DESTRUIR DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**

**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”**

**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**

**“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”**

**“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”**

**“DEBE DAR AVISO A LOS APICULADORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA**

**INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APLICACIÓN”**

**“APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER”**

**Precauciones de almacenaje:** Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible; en un lugar fresco, seco, bien ventilado, lejos del fuego, bajo techo y seguro bajo llave.

**Aviso al consumidor:** Se garantiza la óptima calidad del producto y los porcentajes de ingredientes activos señalados en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control directo. No se da ningún tipo de garantía por consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del producto es de responsabilidad absoluta del usuario.



**NOCIVO**



INSTRUCCIONES DE USO

**Quilate® Plus 45% WP** es un insecticida sistémico y de contacto, recomendado para el control de plagas mordedoras y picador-succionadoras como polillas, pulgones, mosquitos blancos y trips, en las hortalizas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso. **Quilate® Plus 45% WP** actúa por contacto e ingestión con un largo efecto residual.

Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicaciones Terrestres

| Cultivo                                                      | Plaga                                                                                                | Dosis (g/ha) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerezo, Durazno, Nectarino, Damasco, Ciruelo, Pluot, Plumcot | Mosca de las alas manchadas ( <i>Drosophila suzukii</i> ), Polilla oriental ( <i>Cydia molesta</i> ) | 20 - 30 g/hL | Para control de la mosca de alas manchadas, se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones con intervalo de 7 días, desde el inicio de quiebre de color de la fruta, al comenzar el ataque de la plaga. Se sugiere utilizar la dosis menor a menor presión de la plaga. Utilizar mojado de 1.500 L de agua/ha. |
|                                                              |                                                                                                      |              | Para control de polilla oriental, se recomienda aplicar al detectar las primeras oviposiciones en frutos. Realizar 2 aplicación en la temporada a intervalos de 18 – 22 días, según monitoreo de la plaga. Se sugiere utilizar la dosis menor a menor presión de la plaga. Utilizar mojado de 1.500 L de agua/ha.  |

**Preparación de la Mezcla:** Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada de **Quilate® Plus 45% WP**, manteniendo el agitador funcionando. Luego completar con agua hasta el volumen total requerido, manteniendo igualmente el sistema agitador funcionando.

**Modo de Aplicación:** Máximo 3 aplicaciones por temporada, con un intervalo mínimo de 7 días. Utilizar un mojado entre 200 a 800 L de agua/ha, según el estado de fenológico del cultivo. Usar dosis mayores cuando existan presiones de plaga de media a alta y dosis menores cuando exista baja presión de plagas.

**Precauciones:** No aplicar con viento superior a 8 km/h para evitar la deriva, tampoco a horas de calor, ni cuando se pronostican lluvias dentro de 6 horas. No aplicar sobre follaje humedecido.

**Compatibilidad:** **Quilate® Plus 45% WP**, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Si existen dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad bajo la responsabilidad del usuario.

**Incompatibilidad:** **Quilate® Plus 45% WP**, es incompatible con aquellos productos fitosanitarios de marcada reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

**Fitotoxicidad:** **Quilate® Plus 45% WP**, no presenta problemas conocidos de fitotoxicidad si es utilizado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

**Reingreso al Área Tratada:** Se recomienda no ingresar hasta 24 horas después de la aplicación. No es necesario restringir el ingreso de animales, dado que el producto no tiene uso en cultivos destinados a su alimentación.

**Períodos de Carencia:** Durazno, Damasco, Nectarino, Cerezo, Ciruelo, Plumcot y Pluot: 7 días.

**Otras informaciones:** Cuando en una misma zona se usan repetidamente insecticidas de un mismo modo de acción, en este caso Neonicotinoides del grupo IRAC: 4A (Moduladores competitivos del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR) y Piretroides del grupo IRAC: 3A (Moduladores de canales de sodio), podrá producirse la aparición de biotipos resistentes, los cuales podrán extenderse y dominar en la zona. Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos, se recomienda integrar los métodos de control (químico, cultural, biológico y de rotación) en los programas de control de insecto, y en particular, usar insecticidas de diferente modo de acción, ya sean solos o en mezcla con **Quilate® Plus 45% WP**.



NOCIVO

