

## FICHA TÉCNICA

### **SABLE® GEL 0.05%** **INSECTICIDA 0.05% GEL**

#### **Composición:**

Cada 100 p/p contiene: Fipronil 95% técnico: 0,05% p/p (equivalente a 0,049 p/p de Fipronil puro) CAS N°: 120068-37-3 y otros excipientes hasta completar 100% p/p.

**SABLE® GEL 0.05%** es un insecticida que posee alta eficacia en el control de todas las especies de cucarachas o baratas de importancia en sanidad ambiental. Actúa por ingestión, afectando el sistema nervioso con un prolongado efecto residual

#### **INSECTICIDA** **PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS EN SALUD PÚBLICA**

#### **Recomendaciones de uso:**

<b>NIVEL DE INFESTACIÓN</b>	<b>Cucaracha Alemana (<i>Blatella germanica</i>)</b>	<b>Cucaracha Americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha Oriental (<i>Blatta orientalis</i>)</b>
<b>Bajo</b>	* 1 gota	** 2 gotas
<b>Alto</b>	** 2 gotas	*** 3 gotas

**\*Aplice pequeñas gotas de aprox. 2 mm de diámetro por m<sup>2</sup> o por metro lineal**

Se sugiere el uso de 1 gramo por cada 2 metros cuadrados de superficie sobre la cual se observan baratas o hay rastros de ellas.

Remueva la tapa de seguridad de la punta y aplique el gel en lugares disimulados como grietas, rendijas, etc. Lo más cerca de los nidos o por donde pasan las cucarachas.

El máximo control se obtendrá luego de pasados 5 a 7 días de la aplicación. Repetir el tratamiento a los 10 días de la aplicación, procurando reponer los cebos consumidos. Si no se detecta consumo, dejar el cebo aplicado y revisar la siguiente semana.

**Precauciones de Uso:**

- Utilice guantes impermeables para su manipulación y aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Evite el contacto con los ojos, piel y mucosas.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- Mantener el producto lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Mantener el producto en su envase original bien cerrado.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No aplicar en lugares con alta temperatura (ej. Cerca de hornillas, chimeneas, estufas.)
- No aplicar el gel en áreas que se lavan frecuentemente.
- No aplicar en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de contacto (esperar de 7 a 9 días).
- No aplicar insecticidas aerosoles sobre el gel porque se inactiva.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.

**BANDA:**

**Color Franja**

Verde Pantone 347 C

**Clasificación del peligro**

Categoría toxicológica. Clase IV: Poco probable que presente peligro agudo, según clasificación OMS/EPA (2010).